

ZUR

Lane Medical Library

# INFECTION DER MENSCHLICHEN HAUT

MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

DER

HÄNDE.

---

INAUGURAL-DISSERTATION

WELCHE MIT GENEHMIGUNG

DER

EN MEDICINISCHEN FACULTÄT DER KÖNIGLICHEN UNIVERSITÄT Breslau

ZUR ERLANGUNG DER DOCTORWÜRDE

IN DER

MEDICIN UND CHIRURGIE

*Sonnabend, den 18. August 1888, 11 $\frac{1}{2}$  Uhr*

NEBST DEN BEIGEFÜGTEN THESEN

ÖFFENTLICH VERTHEIDIGEN WIRD

**PAUL LANDSBERG**

ASSISTENZARZT AN DER DR. WOLFFBERG'SCHEN AUGENKLINIK IN Breslau.

---

OPPONENTEN:

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Dr. med. JADASSOHN | ) Assistenz-Aerzte an der dermatologischen<br>Klinik, Breslau. |
| Dr. med. FRIEDHEIM |                                                                |

---

WIEN 1888.

WILHELM BRAUMÜLLER

K. K. HOF- UND UNIVERSITÄTSBUCHHÄNDLER.

Zum Druck genehmigt auf Antrag des Referenten

**Herrn Geh. Medicinal-Rath Professor Dr. Fritsch.**

# Herrn Professor Dr. Neisser

Director der Königlichen dermatologischen  
Klinik zu Breslau

in steter Verehrung

sowie



seinen theuren Eltern

in kindlicher Liebe und Dankbarkeit

gewidmet

vom Verfasser.



Das Studium der Hautdesinfection für praktisch-chirurgische Zwecke ist in den letzten Jahren Gegenstand einer Reihe so umfangreicher und gründlicher experimenteller Untersuchungen gewesen, dass man geneigt sein dürfte, das Bedürfniss für eine, auch nur vorwiegend auf dasselbe gerichtete Arbeit zu vertreten. Es war deshalb in der That von vornherein auch nicht die Absicht, eine solche zu liefern; vielmehr begann ich meine Versuche über Desinfection der Haut in erster Linie, um festzustellen, was sie für wissenschaftlich-bacteriologische Prüfungen bietet, ob und wie es möglich ist, für entsprechende Impfversuche die Hautschichten so von den in ihnen hausenden Saprophyten zu befreien, dass man eine Verunreinigung der Culturen durch diese Saprophyten nicht zu fürchten, respective mit ihr nicht zu rechnen braucht. Wenn ich meinen Plan änderte, in die von Kümmell in Hamburg, Forster in Amsterdam und Fürbringer in Berlin, die Autoren der Eingangs angezogenen Arbeiten, beschrittenen Wege einlenkte und schliesslich zum überwiegenden Theile dieselben Ziele wie sie verfolgte, so geschah es, nachdem ich zur Kenntniss gekommen war, wie wenig überflüssig ein nochmaliges Eingehen auf das von jenen beleuchtete Thema, eine Ventilirung namentlich der Frage der für die Chirurgie so wichtigen Händedesinfection sei.

Kümmell<sup>1)</sup> war bei seinen Untersuchungen sehr methodisch zu Wege gegangen. Er hat — ich greife aus seiner Abhandlung nur den uns hier interessirenden Theil heraus — sich folgende Fragen vorgelegt:

1. Bedürfen wir überhaupt der immerhin toxisch wirkenden Antiseptica zur Erzielung einer vollkommenen Desinfection?
2. Sind die Antiseptica die wirksamen Factoren bei den Operationen der Chirurgie?
3. Gibt es ein rasch und sicher wirkendes Antisepticum?

Mit Rücksicht auf die Desinfection der Hände hat er die ersten Fragen zu beantworten gesucht, indem er seine Hände nach wechselnder vorausgegangener Beschäftigung, einmal nach Manipulationen im Operationssaal, das andere Mal nach Sectionen oder auch nach inficirenden Operationen, auf mannigfache Art, mit und ohne Anwendung der Antiseptica bearbeitete, sie alsdann noch feucht in Töpfe mit Koch'schem Nährboden einbohrte und beobachtete, ob dieser steril blieb oder Colonien aufschossen ließen. Nur in ersterem Falle, d. h. bei absolutem Freibleiben von jeder Cultur auch nicht pathogener Mikroorganismen, betrachtete er die Desinfection als gelungen. Auf diese Weise, unter möglichstem Anschluss an die praktischen Verhältnisse, fand er nun, dass die Antiseptica nicht zu entbehren seien, dass sie aber nur dann in Wirkung kämen, nachdem die Hände mit möglichst warmem Wasser, Seife (am besten Kaliseife) und eventuell auch Kleie mittelst Bürste gründlichst gereinigt worden; dass ferner fünfprocentiges Carbol- oder fünfzigprocentiges frisch bereitetes Chlorwasser am sichersten und raschesten desinficire, nächst diesem einpromilliges Sublimat in Frage komme.

Forster<sup>2)</sup> führte seine Versuchsreihe in analoger Weise durch; nur dass er die desinficirten Hände nicht noch feucht in die Nährmasse — sterilisirte neutrale, respective schwach alkalische Fleischwasserpeptonlösung oder Koch'sche Nährgelatine — eintauchte und einbohrte, sondern erst, nachdem sie mit vorher auf 120—140° C. erhitzten Tüchern oder Watte — nicht erhitzt

<sup>1)</sup> Die Contact- und Luftinfection in der praktischen Chirurgie. Centralbl. f. Chir. 1885, pag. 26.

<sup>2)</sup> Wie soll der Arzt seine Hände reinigen? Centralbl. f. klin. Med. 1885, 18.

Handtücher enthalten nach ihm stets saprophytische Pilze — abgetrocknet hatte. Forster erlangte sichere Desinfection nicht durch Carbol-, Salz-, Zink-, Bor- oder Eisenchloridlösung etc., sondern durch einhalb- oder einpromilliges Sublimat nach vorhergehender Reinigung mit Wasser und Seife.

Veranlasst durch den Widerspruch Forster's bezüglich der Sterilität des Sublimats und Carbols, nahm Kümmell seine Untersuchungen nochmals auf, ohne aber zu wesentlich anderen Resultaten zu gelangen, als das erste Mal. In seiner zweiten Veröffentlichung<sup>1)</sup> stellt er zwei Tabellen auf; die erste umfasst die Desinfection nicht inficirter, „normaler“ Hände, die zweite solche nach chirurgischen Operationen — „inficirter“ Hände. „Normale“ Hände wurden durch drei Minuten langes Waschen mit möglichst warmem Wasser und (Kali-) Seife allein genügend gereinigt, durch darauf folgendes Abbürsten mit 1 procentigem Carbolwasser oder Aqua chlori (frisch bereitet) oder Aqua destillata  $\bar{a}\bar{a}$  stets sterilisirt. Wurde statt der genannten Desinfection Sublimat 1 $\frac{0}{100}$  angewandt, so traten in einigen Fällen noch kleine Bacteriencolonien auf; Entwicklung fehlte. Bei Thymol- oder Salicyllösung 6 $\frac{0}{100}$  blieb die Impressionsstelle stets frei, am Rande derselben zeigten sich einmal zwei Bacteriencolonien. Bei dreiprocentigem Carbolwasser fast ausnahmslos Freibleiben. Bei mehrfachen direct folgenden Verbandwechseln genügte es nicht, vor dem ersten das Abbürsten mit Wasser und Seife, vor dem folgenden alleiniges Abwaschen mit desinficirenden Lösungen vorzunehmen, vielmehr musste die Reinigung mit Wasser und Seife jedesmal von Neuem erfolgen.

„Inficirte“ Hände, mehrmals mit warmem Wasser und Seife gewaschen, lieferten zahlreiche Colonien. Desgleichen, wenn der Verbandwechsel mit Wasser und Seife Abbürsten mit Bor-, Thymol- oder Salicyllösung gefolgt, oder wenn die Waschung mit Unna'scher Ichthyol- oder Sublimatseife vorgenommen war. Dagegen blieben die Hände nach fünf Minuten langer Vorbereitung mit Wasser, Seife und Bürste und nachfolgender zwei Minuten währender Desinfection mit Aqua chlori, Aqua destillata  $\bar{a}\bar{a}$  und Bürste

<sup>1)</sup> Wie soll der Arzt seine Hände desinficiren? Centralbl. f. Chir. 1886, 289.

jedesmal steril. Zur Unterscheidung, ob dem Abseifen oder der Desinfection der grössere Werth beizulegen sei, wurde die rechte Hand fünf Minuten mit warmem Wasser und Seife abgebürstet, zwei Minuten mit Sublimat  $1\frac{0}{100}$  abgerieben: zwei Keime an einer von einem Finger berührten Stelle, Impressionsstelle frei; linke Hand wurde weniger gründlich behandelt: Reihe verschiedener Colonien. Zu demselben Zwecke wurde die eine Hand weniger gründlich mit warmem Wasser und Seife abgebürstet, mit fünfprocentigem Carbolwasser desinficirt: zwei Colonien; andere Hand gründlicher bearbeitet: keine Colonie. Bei Sublimation nicht häufig vollkommene Keimfreiheit.<sup>1)</sup> Andererseits selbst das fünfprocentiges Carbolwasser nach genügender Vorbereitung meist völlig wirksam.

In praxi verlangt K ü m m e l l selbstverständlich nicht bloss die Desinfection der Hände, sondern des ganzen Unterarmes. In der Prophylaxe, das Fernbleiben von jeder Infection sei immer die erste Linie anzustreben; nach erfolgter Infection sei ausser der Desinfection der Hände, respective Arme, Abbaden und Abseifen des ganzen Körpers und Kleiderwechsel nothwendig.

Fürbringer<sup>2)</sup> hat sich bei seinen Desinfectionsversuchen einer anderen Prüfungsmethode für den Keimgehalt der Hände bedient, als K ü m m e l l und Forster, in der Ueberzeugung, dass der Finger aus seinem „subungualen“ Raum, d. i. dem Raum zwischen vorderem Nagelrand und Fingerbeere, dem vornehmlichsten und sichersten Schlupfwinkel für Mikroorganismen, an dem erstarrete, elastisch-brüchige Nährgelatine weniger von seinem Inhalt abgibt, als an die ihn lange umspülende warme Flüssigkeit in Wundhöhlen etc., dass er jene also steril lassen könne, während er diese inficiren würde. Er hat demnach den Unternagelraum vollständig zu erforschen gesucht, indem er ihn „mittelst kurz durch die Enden einer Klemmpincette fixirter und innerhalb dies

<sup>1)</sup> Man wird daran denken müssen, dass vielleicht hier noch nicht stets die bezüglich der Zubereitung der Sublimatlösungen nothwendigen, von Fürbringer in der nachstehend citirten Abhandlung ausführlich auseinandergesetzten Vorsichtsmassregeln stattgehabt haben.

<sup>2)</sup> Untersuchungen und Vorschriften über die Desinfection der Hände des Arztes, nebst Bemerkungen über den bacteriologischen Charakter des Nagelschmutzes. Wiesbaden, Verlag von J. F. Bergmann. 1888.

der Flamme sterilisirter, dünner, rauher Drahtstifte auskehrte (intensives Abraspeln der Epidermiszellen wurde als den tatsächlichen Verhältnissen bei ärztlichen Manipulationen wenig entprechend vermieden), die Drahtstifte durch Lösung der Branchen das Reagensglas mit der flüssig gemachten Gelatine fallen lassen und in der letzteren agitirte“. Die Gelatine erstarrte bei horizontaler Stellung der Reagensgläser. Die Entwicklung Keime erfolgte bei Zimmertemperatur. In einigen Fällen wurden statt der Drahtstifte schwedische Zündhölzchen mit durch schrägen Schnitt entfernten Kopf benützt, deren keilförmig jüngste Enden durch einen Schnitt mit sterilisirter Scheere in Gelatine fallen gelassen wurden. Durch Controlversuche hatte Fürbringer vorher die Zündhölzchen, wofern sie den tieferen Richten frischer, beziehungsweise gefüllter Schachteln entnommen waren, als brauchbar befunden. Die Vergleiche der beschriebenen Methode mit der von Kümmell und Forster geübten, liessen sehr die grössere Sicherheit der ersteren hervortreten, dass sie die „wahre Nagelprobe“ zu gelten habe. Das Desinfectionsverfahren Fürbringer's unterscheidet sich von den sonst gebräuchlichen dadurch, dass er bei der Vorbereitung der Hände die Desinfection Alkohol in Gebrauch zog und sich so in den Stand gesetzt sah, die vollständige Sterilisirung der Hände — es ist hier erwähnt, dass auch Fürbringer aus praktischen Rücksichten die Befreiung der Hand nicht nur von den pathogenen, sondern von allen Keimen verlangt — in kürzerer Zeit zu erreichen, als ohne die Einschaltung genannten Mittels. Seine Vorschrift lautet:

1. Die Nägel — ein Kürzen derselben ist nicht unbedingt nöthig — werden auf trockenem Wege von eventuell sichtbarem Schmutze befreit;

2. die Hände werden eine Minute lang allenthalben mit kaltem und recht warmem Wasser gründlich abgebürstet, insbesondere die Unternagelräume bearbeitet;

3. darauf werden sie ebenfalls eine Minute lang in Alkohol, wärmte unter 80°, gewaschen und darauf sofort vor dem Abdunsten getrocknet;

4. in die antiseptische Flüssigkeit, dreiprocentige Carbolsäurelösung oder vielleicht besser ein- bis zweipromilliges Sublimat.

— eine sichere Superiorität der einen über die andere konnte Fürbringer im Gegensatz zu Forster und Kümmell nicht constataren — gebracht und mit dieser gleichfalls eine Minute lang gründlich bearbeitet.

Die derartig präparirten Hände werden nicht noch feucht untersucht, wie bei Kümmell, sondern zuvörderst mit reinen, nicht besonders zubereiteten Handtüchern abgetrocknet; ein Abgeben von Keimen Seitens derselben wurde entgegen der Forster'schen Behauptung und im Einklang zu den Angaben von Gärtner und Plagge (in Langenbeck's Archiv, XXXII, 2. 1885) nicht constatirt.

Fürbringer lässt seine Methode ohne Unterschied für „normale“ und für „infectirte“ Hände — nach den Kümmell'schen Begriffen — gelten. Es war ihm nicht möglich, die von Kümmell betonte Erschwerung der Desinfection bei letzteren zu constataren; im Gegentheil hätten oft gerade die normalen Hände ein ungünstigeres Desinfectionsresultat ergeben; — Abstinenzfrage! — es sei auch nach den vom Verfasser über den bacteriologischen Charakter des Nagelschmutzes gegebenen Aufschlüssen nicht zu verstehen, „warum den Bacterien in den Producten des kranken oder faulenden menschlichen Körpers auch nur im Allgemeinen eine grössere Widerstandsfähigkeit, als den in anderem Unrath nistenden Mikroorganismen zukommen sollte“.

Durch derartige Erwägungen werden sich aber freilich wohl nur die Wenigsten verhindern lassen, nach Sectionen oder entsprechenden Operationen ihren Händen eine grössere Sorgfalt zu widmen, in der Ueberlegung, dass eine mangelhafte Desinfection bei Infection mit erfahrungsgemäss den menschlichen Körper schwer schädigenden Mikroorganismen unvergleichlich verhängnissvoller werden kann, als eine ungenügende Reinigung nur „normal schmutziger“ Hände. Man wird es immer für gerathen halten, so lange das Desinfectionsverfahren nicht in allen Theilen als ein absolut sicheres bezeichnet werden kann, in ersterem Falle lieber des Guten etwas zu viel zu thun. Und diese absolute Sicherheit hat Fürbringer für sein Verfahren, welches ja a priori sehr bestechend erscheint, durch seine Versuche wohl kaum erwiesen. Es werden 24 Waschungen mit Seife, Alkohol und Sublimat aufgeführt, von denen 18 vollkommene Sterilisirung erzeugten, 6 je

1—6 Colonien übrig liessen. Die Beweiskraft dieser Zahlen schränkt Fürbringer selbst noch ein durch die Beurtheilung zweier Versuchsreihen, welche er angestellt hat und aufführt, um den Antheil der einzelnen Componenten seiner Desinfectionsmethode am Erfolge derselben zu illustriren. In jeder dieser Reihen von je vier Versuchen steht nämlich einer dieser Versuche im Widerspruche zu den anderen drei — in der ersten gibt einmal Seife und Alkohol ein besseres Resultat, als Seife, Alkohol, Sublimat; in der zweiten hat einmal Seife, Alkohol, Sublimat weniger geleistet, als Alkohol und Sublimat ohne Seife; — diese Widersprüche nun erklärt Fürbringer als auf Fehlern der Technik beruhend, innerhalb der Fehlerquellen liegend, nimmt also 25 Procent Fehlerquellen an! Auf eine Fortsetzung der Versuche, deren rein mechanischen Charakter er sonderlichen Beschäftigungsreiz nicht abzugewinnen vermochte, verzichtete Fürbringer, weil eine solche „die Resultate möglicherweise erheblich verschoben, am Gesetz aber nichts Wesentliches geändert haben würde“.

---

Meine eigenen Untersuchungen begann ich an der Leiche, weil ich hier die grösstmögliche Freiheit hatte, durch Uebertragung excidirter Hautstückchen auf den Nährboden sicher die Beeinflussung aller, auch der tieferen Abschnitte der Haut durch die vorangegangene Desinfection zu erkunden, und dieser Aufklärung bedurfte ich, wollte ich die oben bezeichneten wissenschaftlichen Zwecke fördern. Natürlich hat eine solche genauere Untersuchungsmethode ebenso Werth für die chirurgischen Desinfectionsfragen, für welche allein nur oberflächlichere Theile berücksichtigt werden brauchten. Auch die Therapie der parasitären Hautkrankheiten könnte aus derartig gewonnenen Beobachtungen Nutzen ziehen. Dass ich nicht etwa die an den Unterextremitäten der Cadaver, welche ich zu den Versuchen benützte, gefundenen Thatsachen ohne Umstände auf die Hände des Arztes übertragen wollte, sei, so selbstverständlich es ist, schon hier betont. Der Gang der Versuche war folgender:

Partien der Unterextremitäten von etwa Handgrösse wurden in der nachstehend bezeichneten Weise bearbeitet, alsdann aus diesem Bereich flache Hautstückchen mit in der Flamme sterilisirter Scheere und Pincette abgetragen und in Reagensgläsern

mit stark schräg gegossener Nährmasse<sup>1)</sup> fallen gelassen, mit steriler Platinnadel nach mehrfachem Hin- und Herschieben mit der Epidermisseite nach unten ausgebreitet. Meistentheils wurden am nächsten Tage, falls — im Brütöfen — noch keine oder sehr spärliche Entwicklung erfolgt war, die Hautstückchen nochmal mit dem Platindraht auf der Agar-Agar-Fläche verschoben, um eventuelle Wachstumsbehinderung durch mangelhaften Luftzutritt ausschliessen zu können.

Als Versuchsobjecte wurden, wenn nichts Anderes bemerkt, frische Cadaver gewählt. Die Beschaffenheit der Haut wurde jedesmal aufnotirt und ist in der folgenden Tabelle in der dritten Columnne bemerkt; in der ersten Reihe ist angegeben, wie viele Gläschen zum Versuch verwandt und mit — je einem — Hautstückchen beschickt wurden; in der zweiten, wie viel steril blieben (—), respective welche Wachsthum zeigten (+), wobei zugleich der Zeitpunkt des Auftretens der ersten Herde bemerkt ist.

#### Warmes Wasser und Kaliseife: nachfolgend Desinficiens.

5 Minuten langes Bürsten der Haut mit den beiden ersten; Abspülen des Seifenschaumes mit sterilisirtem Wasser. Darauf 2 Minuten langes Bürsten mit dem Desinficiens. Wiederum Abspülen mit sterilem Wasser. Darauf durch Aufgiessen von Alkohol oder Aether das Wasser verdunstet und die Haut getrocknet.

#### *Sublimatwasser 1·0 : 1000·0.*

1. 5 Gläser. | 5 —

*Saures Sublimat*<sup>2)</sup>.

2. 5 Gläser. | 1 + am 3. Tage.

} Die Leiche war eine Stunde vorher mit kaltem Wasser abgespült worden. Haut glatt und sauber, sehr wenig behaart. Rechter und linker Oberschenkel.

<sup>1)</sup> Der Nährboden hatte nach der im Laboratorium der königl. dermatologischen Klinik zu Breslau üblichen Zubereitungsweise folgende Zusammensetzung:

500·0 Wasser,  
7·5 Agar-Agar,  
2·0 Kemmerich'sches Fleischpepton,  
5·0 Peptonum siccum,  
neutralisirt mit phosphorsaurem Natron.

<sup>2)</sup> Nach der Vorschrift von Laplace, New-Orleans: Saure Sublimat-

*Carbolwasser 5·0 : 100·0.*

|              |                |                                                          |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 3. 5 Gläser. | 1 +, am 3. Tg. | Wie bei 1 und 2. Rechter Unterschenkel derselben Leiche. |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|

*Creolinwasser 3·0 : 100·0.*

|                                                                 |                |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 4. 10 Gläser.                                                   | 1 +, am 7. Tg. | } Haut glatt, nicht ganz sauber, unbehaart. Oberschenkel. |
| <i>Wässerige Lösung von Thallium sulfuricum 3·0 : 100·0.</i>    |                |                                                           |
| 5. 15 Gläser.                                                   | 6 +, 3.—6. Tg. | }                                                         |
| <i>Wässerige Lösung von Natrium chloro-borosum 2·5 : 100·0.</i> |                |                                                           |

|                                                                 |                 |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 10 Gläser.                                                   | 6 +, 4.—10. Tg. | } Haut nicht ganz sauber, ziemlich rauh, mässig behaart. Unterschenkel der vorigen Leiche. |
| <i>Gesättigte wässerige Lösung von Natrium fluor-silicatum.</i> |                 |                                                                                            |
| 7. 9 Gläser.                                                    | 1 +, 8. Tg.     | }                                                                                          |
| <i>Wässerige Lösung von Natrium chloro-borosum 2·5 : 100·0.</i> |                 |                                                                                            |

**Warmes Wasser und Kaliseife** (gewöhnliche Schmierseife).

5 Minuten langes Bürsten; darauf Abspülung und Trocknung, wie beim vorigen.

|              |             |                                                                                                            |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 9 Gläser. | 1 +, 4. Tg. | Haut rauh, nicht ganz sauber, stark behaart. Haare vor der Reinigung etwas gekürzt. Rechter Unterschenkel. |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Warmes Wasser und Natronseife.**

5 Minuten damit gebürstet, abgespült, getrocknet.

|              |                |                                                   |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 9. 9 Gläser. | 6 +, 4.—9. Tg. | Wie bei 8. Linker Unterschenkel derselben Leiche. |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|

**Hebra'scher Seifenspiritus.** (Saponis viridis 50·0, Spirit. Lavendul., Aq. destill. aa 25·0.)

Haut 5 Minuten damit unter Zuhilfenahme von — nicht erwärmtem — Wasser gebürstet, abgespült, getrocknet.

Lösung als desinficirendes Mittel und ihre Verwendung in Verbandstoffen. Arbeit aus dem Reichsgesundheitsamt. Deutsche med. Wochenschr. 1887, Nr. 40.

Sublimat 1·0  
Acid. tartar. 5·0  
Aqua destill. 1000·0.

Wo im Folgenden von saurem Sublimat gesprochen wird, ist stets diese Zusammensetzung gemeint,

|     |           |                 |                                                                     |
|-----|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10. | 2 Gläser. | 2 +, 3.—4. Tg.  | Haut glatt, sauber, weiss, ziemlich behaart. Rechter Unterschenkel. |
| 11. | 3 „       | 3 —             | Haut sehr glatt, sauber, fast unbehaart. Rechter Oberschenkel.      |
| 12. | 10 „      | 10 +, 3.—5. Tg. | Haut glatt, sauber, unbehaart. Rechter Oberschenkel.                |

**Zehnprocentiger Carbolseifenspirit.** (Carbolzusatz zu Hebra'schem Seifenspirit.)

Wie beim vorigen.

|     |           |                |                                                    |
|-----|-----------|----------------|----------------------------------------------------|
| 13. | 2 Gläser. | 2 +, 4.—7. Tg. | Wie bei 10. Linker Unterschenkel derselben Leiche. |
| 14. | 3 „       | 3 —            | Wie bei 11. Linker Oberschenkel derselben Leiche.  |
| 15. | 10 „      | 9 +, 3.—5. Tg. | Wie bei 12. Linker Oberschenkel derselben Leiche.  |

Anmerkung: Kopfhaut mit dichtem Haar in gleicher Weise behandelt.

3 Gläser. | 3 +, 2 Tg.

**Einprocentiger Thymolseifenspirit.**

Wie beim vorigen.

|     |            |            |                                                     |
|-----|------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 16. | 10 Gläser. | 1 +, 5 Tg. | Wie bei 12. Rechter Unterschenkel derselben Leiche. |
|-----|------------|------------|-----------------------------------------------------|

**Zehnprocentiger Creolinseifenspirit.**

Wie vorher.

|     |            |      |                                                     |
|-----|------------|------|-----------------------------------------------------|
| 17. | 10 Gläser. | 10 — | Haut glatt, sauber, haarlos. Rechter Unterschenkel. |
|-----|------------|------|-----------------------------------------------------|

**Seifenspirit, nachfolgend Desinficiens.**

5 Minuten mit ersterem gebürstet, abgespült; darauf 2 Minuten mit letzterem gebürstet, wiederum abgespült, getrocknet.

*Carbolwasser 5·0:100·0.*

|     |           |                 |                                                                                   |
|-----|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | 3 Gläser. | 2 +, 9.—12. Tg. | Haut gelblich, rau, behaart. Sepsis nach Amputatio humeri. Rechter Unterschenkel. |
|-----|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

*Sublimatwasser 1·0:1000·0.*

|     |           |                 |                                                    |
|-----|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 19. | 3 Gläser. | 2 +, 9.—12. Tg. | Wie bei 18. Linker Unterschenkel derselben Leiche. |
|-----|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|

**Alcohol absolutus.**

Haut 5 Minuten damit gebürstet.

|               |                |                                                     |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 20. 2 Gläser. | 2 +, 3.—5. Tg. | Wie bei 10. Linker Oberschenkel derselben Leiche.   |
| 21. 3 „       | 3 +, 2.—4. Tg. | Wie bei 11. Rechter Unterschenkel derselben Leiche. |

**Aether sulfuricus.**

5 Minuten gebürstet.

|               |                |                                                    |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 22. 3 Gläser. | 3 +, 3.—8. Tg. | Wie bei 11. Linker Unterschenkel derselben Leiche. |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|

**Carbolalkohol 5·0:100·0.**

5 Minuten gebürstet, abgespült, getrocknet.

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 23. 3 Gläser.   3 —         | } Starker Icterus. Haut aber glatt,<br>sauber, mässig behaart. |
| Carbolalkohol 3·0:100·0.    |                                                                |
| Dasselbe Verfahren.         |                                                                |
| 24. 3 Gläser.   1 +, 9. Tg. |                                                                |
| Carbolwasser 5·0:100·0.     |                                                                |
| Dasselbe Verfahren.         | 23. Rechter Unterschenkel.                                     |
| 25. 3 Gläser.   3 —         | 24. Linker                                                     |
|                             | 25. Rechter Oberschenkel.                                      |

**Creolinwasser 5·0:100·0.**

Dasselbe Verfahren.

|                |                |                                                                                       |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. 10 Gläser. | 8 +, 3.—5. Tg. | Leiche schon zwei Tage alt. Haut aber sauber, glatt, unbehaart. Rechter Oberschenkel. |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Thymolalkohol 1·0:100·0.**

Dasselbe Verfahren.

|                |      |                                                    |
|----------------|------|----------------------------------------------------|
| 27. 10 Gläser. | 10 — | Wie bei 12. Linker Unterschenkel derselben Leiche. |
|----------------|------|----------------------------------------------------|

**Sublimatwasser 1·0:100·0.**

Dasselbe Verfahren.

|               |     |                                                      |
|---------------|-----|------------------------------------------------------|
| 28. 3 Gläser. | 3 — | Haut sauber, glatt, unbehaart. Rechter Oberschenkel. |
|---------------|-----|------------------------------------------------------|

**Saures Sublimat.**

Dasselbe Verfahren.

|               |                |                                                     |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 29. 4 Gläser. | 2 +, 3.—5. Tg. | Haut unsauber, rau, behaart. Rechter Unterschenkel. |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|

**Borwasser 40:1000.**

Dasselbe Verfahren. Epidermis stark heruntergeschauert.

|               |                |                                                                           |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 30. 8 Gläser. | 3 +, 2.—5. Tg. | Haut rau, schuppig, schmutzig gelb, fast unbehaart. Rechter Oberschenkel. |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

Dasselbe Verfahren; nachträglich noch die übrige Epidermis mit steriler Scheere heruntergekratzt.

|               |             |                                  |
|---------------|-------------|----------------------------------|
| 31. 8 Gläser. | 1 +, 3. Tg. | Wie bei 30. Linker Oberschenkel. |
|---------------|-------------|----------------------------------|

**Oleum terebinthinae — Aether sulfuricus.**

3 Minuten mit ersterem, darauf 2 Minuten mit letzterem mittelst Tampon gereinigt.

|                |                |                                                                    |
|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 32. 4 Gläser.  | 3 +, 2.—8. Tg. | Haut unsauber, rau, unbehaart. Rechter Oberschenkel der Leiche 29. |
| 33. 10 Gläser. | 8 +, 3.—5. Tg. | Wie bei 26. Linker Oberschenkel derselben Leiche.                  |

**Fünfprocentiges Carbolöl-Aether.**

Wie beim vorigen.

|               |             |                                                                                          |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. 2 Gläser. | 1 +, 5. Tg. | Wie bei 28. Linker Oberschenkel derselben Leiche.                                        |
| 35. 8 Gläser. | 1 +, 4. Tg. | Haut rau, schuppig, schmutzig gelb, mässig behaart. Rechter Unterschenkel der Leiche 30. |

**Anilinöl-Aether.**

Das gleiche Verfahren.

|               |             |                                                                                |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 36. 3 Gläser. | 1 +, 3. Tg. | Wie bei 28. Rechter Unterschenkel derselben Leiche.                            |
| 37. 6 Gläser. | 1 +, 6. Tg. | Haut rau, nicht ganz sauber, stark behaart. Rechter Oberschenkel der Leiche 8. |

**Leberthran-Aether.**

Das gleiche Verfahren.

|               |                 |                                                                               |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 38. 3 Gläser. | 3 —             | Wie bei 28. Linker Unterschenkel derselben Leiche.                            |
| 39. 6 Gläser. | 4 +, 3.—10. Tg. | Haut rau, nicht ganz sauber, stark behaart. Linker Oberschenkel der Leiche 8. |

### Ungt. cinereum-Aether.

3 Minuten lang ersteres mittelst Stempel eingerieben; dann die Haut durch 2 Minuten langes Abreiben mit Aether mittelst Tampon wieder von der Salbe befreit.

|               |            |                                                    |
|---------------|------------|----------------------------------------------------|
| 40. 3 Gläser. | 3 —        | Wie bei 18. Rechter Oberschenkel derselben Leiche. |
| 41. 8 Gläser. | 1 +, 2 Tg. | Wie bei 35. Linker Unterschenkel derselben Leiche. |

### Warmes Wasser und Unna'sche Desinfectionsseife.

5 Minuten langes Bürsten etc.

*5%ige Carbolseife.*

42. 10 Gläser. | 7 +, 3.—6. Tg.

*5%ige Salicylseife.*

43. 10 Gläser. | 10 +, 2.—4. Tg.

*Salicyl (10%) — Zinkoxyd (2%) Seife.*

44. 10 Gläser. | 6 +, 3.—7. Tg.

*10%ige Ichthyolseife.*

45. 10 Gläser. | 4 +, 3.—4. Tg.

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Haut sauber,<br>aber spröde<br>und schuppig,<br>mässig be-<br>haart. Oedem. | Rechter Ober-<br>schenkel.  |
|                                                                             | Linker Ober-<br>schenkel.   |
|                                                                             | Rechter Unter-<br>schenkel. |
|                                                                             | Linker Unter-<br>schenkel.  |

### Liquor Alumin. acetic. in verschiedener Concentration.

5 Minuten langes Bürsten.

*Mit zwei Theilen Wasser verdünnt.*

46. 10 Gläser. | 8 +, 2.—6. Tg.

*Dieselbe Concentration; die Haut vorher rasirt (gewöhnlicher Seifenschaum).*

47. 10 Gläser. | 3 +, 3.—15. Tg.

Haut sauber, glatt, mit spärlichen, langen Haaren besetzt. Rechter und linker Unterschenkel der Leiche 26 (zwei Tage alt).

*Liqu. Alumin. — Aqua aa.*

48. 10 Gläser. | 9 +, 3.—15. Tg.

*Liqu. Alumin. unverdünnt.*

49. 10 Gläser. | 7 +, 3.—13. Tg.

Wie bei 17. Rechter und linker Oberschenkel derselben Leiche.

**Jodtinctur.**

Die Haut damit bepinselt. Nach mehreren Minuten Hautstückchen mit steriler Scheere excidirt, in sterile Reagensgläser aus diesen am nächsten Tage (nachdem das Jod verdampft) auf Agar-Agar gebracht.

|                |      |                                                                       |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 50. 2 Gläser.  | 2 —  | Fussgelenkgegend der Leiche 4—7 mit rauher, nicht ganz sauberer Haut. |
| 51. 10 Gläser. | 10 — | Fussgelenkgegend der Leiche 42—45, mit glatter, sauberer Haut.        |

Die Haut bepinselt; nach circa 5 Minuten die aufgespritzte Jodtinctur mit Aether heruntergewaschen; die Hautstückchen wie gewöhnlich behandelt.

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| 52. 3 Gläser. | 1 +, 4. Tg. | Wie bei 50. |
|---------------|-------------|-------------|

Erst nach 15 Minuten mit Aether abgewaschen.

|                |      |             |
|----------------|------|-------------|
| 53. 10 Gläser. | 10 — | Wie bei 51. |
|----------------|------|-------------|

**Argentum nitricum.**

Die Haut damit bepinselt. Nach 15 Minuten Hautstückchen excidirt (wie gewöhnlich behandelt).

*1%ige wässerige Lösung.*

|               |             |                                                               |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 54. 6 Gläser. | 1 +, 4. Tg. | Fussgelenkgegend der Leiche 8. Haut sauber, glatt, unbehaart. |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------|

*10%ige Lösung.*

|               |     |  |
|---------------|-----|--|
| 55. 6 Gläser. | 6 — |  |
|---------------|-----|--|

**Anhang.**

Die Epidermis mit sterilem Messer heruntergekratzt; alsdann Hautstückchen zur Prüfung excidirt.

|                                                             |                |                                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 56. 6 Gläser.                                               | 4 +, 3.—5. Tg. | Fussgelenkgegend der Leiche 12.         |
| zum Vergleich; von der umliegenden Partie ohne Präparation: |                |                                         |
| 57. 6 Gläser.                                               | 6 +, 2.—5. Tg. | Haut glatt, haarlos, nicht ganz sauber. |

Die Frage, was von den Hautstückchen aus gewachsen ist, kann nach vielfacher Prüfung mit kurzen Worten dahin beantwortet werden, dass in bunter Reihe Coccen in allen möglichen

Farben, Grössen und Gruppierungen, Bacillen in den verschiedensten Dimensionen, mit und ohne Sporen, mitunter auch Schimmelpilze gediehen, ohne dass sich ein Hinweis auf die Reinigungsart erkennen liess. Bacillen entwickelten sich meistentheils erst später, als die Coccen, welche gleich in den ersten Tagen auf dem Nährboden aufsprossen. In mit unpräparirten Hautstückchen beschickten Culturgläsern überwucherten die Schimmelpilze in der Regel bald alle anderen Mikroorganismen.

Ordne ich, um das Resumé der eben aufgeführten Versuche zu ziehen, die probirten Reinigungsmethoden nach ihrer Wirksamkeit, wie sie die Desinfectionserfolge ergeben, so zeigt sich, dass

sich ausreichend bewährt haben:

- |        |        |         |     |                                      |                                                    |         |
|--------|--------|---------|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| 5 Min. | langes | Bürsten | mit | 10 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> igem | Creolinseifenspirit                                | us,     |
| 5 Min. | "      | "       | "   | 1 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> igem  | Thymolseifenspirit                                 | us,     |
| 5 Min. | "      | "       | "   | warmem                               | Wasser und Kaliseife                               | allein, |
|        |        |         |     |                                      | sowie mit nachfolgendem                            |         |
| 2 Min. | "      | "       | "   | 1 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> igem  | Sublimatwasser,                                    |         |
|        |        |         |     |                                      | saurem Sublimat,                                   |         |
|        |        |         |     |                                      | 5 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> igem Carbolwasser,  |         |
|        |        |         |     |                                      | 3 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> igem Creolinwasser, |         |
|        |        |         |     |                                      | gesättigter Lösung von Natrium fluor-              |         |
|        |        |         |     |                                      | silicatum.                                         |         |

Aufpinseln von Jodtinctur,

- |        |        |         |     |                                                                       |                               |
|--------|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| "      | "      | "       | "   | 1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> und 10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> iger | Lösung von Argentum nitricum, |
| 5 Min. | langes | Bürsten | mit | 5 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> igem                                   | Carbolwasser,                 |
| "      | "      | "       | "   | 3 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> und 5 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> igem  | Carbolalkohol.                |
| "      | "      | "       | "   | 1 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> igem                                   | Thymolalkohol.                |
| "      | "      | "       | "   | 1 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> igem                                   | Sublimatwasser.               |

weniger ausreichend waren:

- |        |        |         |     |                                                                   |                            |
|--------|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5 Min. | langes | Bürsten | mit | saurem                                                            | Sublimat,                  |
| "      | "      | "       | "   | 4 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> igem                               | Borwasser,                 |
| "      | "      | "       | "   | 33 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> iger                              | Lösung von Liqueur Alumin. |
|        |        |         |     | acet. nach vorherigem Rasiren,                                    |                            |
| "      | "      | "       | "   | Seifenspirit                                                      | us, gefolgt von 2 Minuten  |
|        |        |         |     | während der Bürstung mit 5 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> igem Car- |                            |
|        |        |         |     | bol- oder 1 <sup>0</sup> / <sub>00</sub> igem Sublimatwasser.     |                            |

3 beziehungsweise 2 Minuten lange Tamponreinigung mit Oelen  
resp. Fetten und Aether;

die Misserfolge überwogen bei:

|               |         |     |                                                                                          |
|---------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 Min. langem | Bürsten | mit | warmem Wasser und Natronseife,                                                           |
| "             | "       | "   | " warmem Wasser und Unna'schen                                                           |
| "             | "       | "   | Desinfectionsseifen,                                                                     |
| "             | "       | "   | 10 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> igem Carbolseifenspiritus,                                |
| "             | "       | "   | " warmem Wasser und Kaliseife, ge-                                                       |
|               |         |     | folgt von 2 Minuten langem Bürsten                                                       |
|               |         |     | mit 3 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> iger wässriger Lösung von                              |
|               |         |     | Thallinum sulfuricum oder 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> iger |
|               |         |     | Lösung von Natrium chloro-borosum.                                                       |

wenig und gar nichts leisteten:

|               |         |     |                                                   |
|---------------|---------|-----|---------------------------------------------------|
| 5 Min. langes | Bürsten | mit | Seifenspiritus,                                   |
| "             | "       | "   | " Liqu. Alumin. acet. in 33-, 50- und             |
| "             | "       | "   | 100 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> iger Lösung,      |
| "             | "       | "   | 3 <sup>0</sup> / <sub>0</sub> igem Creolinwasser; |
| "             | "       | "   | " Alkohol absolutus,                              |
| "             | "       | "   | " Aether sulfuricus.                              |

Will man diese Scala, in welcher vor Allem die vollkommene, ohne Unterstützung durch mechanische Hilfsmittel, eingetretene Wirkung der Jodtinctur und des Argentum nitricum hervorsticht, und in der weiter auch der im Verhältniss zu dem milden Verfahren — statt der Bürste Wattetampons gebraucht — gute Erfolg auffällt, welchen die combinirte Anwendung eines Oeles, respective einer Salbe und des Aethers (er musste der Combination beider Mittel zugeschrieben werden, weil er den einzelnen Componenten nicht zukommt) gehabt hat, — will man jene Scala also allgemeinen Nutzenanwendungen zu Grunde legen so muss man wissen, welche Umstände ihre Giltigkeit herabzusetzen geeignet sind. Hierbei ist zunächst die Ungleichmässigkeit des bearbeiteten Materials zu beachten, wie sie aus der dritten Reihe der vorangeschickten Tabelle erhellt. Bald war die Haut glatt und sauber, bald verunreinigt, runzelig, schuppig, bald haarlos, bald mit langen oder dichten Haaren bedeckt; mitunter

auch durch Krankheitsprocesse verändert. — Sehr wechselnd war die Widerstandsfähigkeit, die Ablöslichkeit der Epidermis; die daraus entspringenden Unterschiede liessen sich durch angepassten, hier milderer, dort stärkeren Gebrauch der Bürste wohl nur zum Theil ausgleichen. — Die Aufnahmefähigkeit für Mikroorganismen einerseits, die Durchdringlichkeit für die jene tödtenden Mittel andererseits, ist sicher nicht die gleiche an der lebenden, wie an der toten Haut. Vielleicht tragen hier anscheinend geringe Differenzen in dem Alter der Leichen die Schuld, dass sich diesbezügliche Veränderungen einmal gegenseitig die Wage halten, ein andermal die Resultate verschieben.

Ich verlasse das Gebiet der Leichenversuche; für mich hatten sie schon Werth als Vorversuche für das folgende, für das sie mir bezüglich der Einrichtung der Desinfectionsmethoden, der Technik, auch der Beurtheilung der Ergebnisse manchen Anhaltspunkt gaben.

Wie von der Leiche, bot sich mir auch die Möglichkeit, vom Lebenden ganze Haut- (eigige Schleimhaut-) Stückchen durch Excision zu gewinnen und zur Prüfung ihres Keimgehaltes nach vorausgegangener Waschung auf Nährleim zu überpflanzen, gelegentlich einiger in der königl. dermatolog. Klinik zu Breslau ausgeführten Operationen; dieselben betrafen die Genitalorgane. Zur Reinigung war der in der dermatologischen Klinik viel gebrauchte 10%ige Carbolsaifenspiritus (s. o.!) und warmes Wasser benutzt worden, in welcher Weise, ist bei den einzelnen Versuchen angegeben. Der Seifenschaum wurde mit sterilisirtem Wasser abgespült, die Haut mit absolutem Alkohol oder Aether getrocknet, die Haut- (Schleimhaut-) Stückchen mit durch Hitze sterilisirtem Messer oder Scheere und Pincette excidirt und wie bei den Leichenversuchen auf Agar-Agar gebracht.

### Phimosis.

Bei vorgezogenem Präputium das obere Blatt desselben 5 Minuten lang mittelst Tampon gereinigt. Aus ihm die Stücke entnommen.

1. 2 Gläser. | 2 — | 20jähriger Mann. Kein Secret.

**Bubo.**

Die beiderseitige Inguinalgegend zusammen 5 Minuten lang behutsam gebürstet; von jeder Seite ein Hautstückchen entnommen.

|              |                                                                                                       |                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 2 Gläser. | 2 +, 2.—3. Tg.<br>weisse und orange-<br>farbene Herde von<br>Traubencoccen und<br>kurzen Coccenketten | Kind. Der Bubo doppelseitig<br>oberflächlich nicht vereitert. Haut<br>makroskopisch intact. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**Elephantiasis clitoridis.**

Vulva 5 Minuten lang mit der Bürste gesäubert. Zwei Stückchen von der Oberfläche der elephantiasischen Wucherung excidirt.

|              |     |               |
|--------------|-----|---------------|
| 3. 2 Gläser. | 2 — | Aeltere Frau. |
|--------------|-----|---------------|

**Bubo.**

Inguinalgegend unter Anwendung von mit zehnprocentigem Carbolseifenspiritus erzeugten Seifenschaum rasirt, mit sterilem Wasser abgespült (zwei Minuten mit Bürste, darauf 3 Minuten mit Tampon gereinigt).

|              |                                            |                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 2 Gläser. | 2 +, 2. Tg.<br>verschiedenartige<br>Coccen | 20jähriger Mann. Einseitiger Bubo,<br>oberflächlich nicht vereitert. Haut<br>anscheinend noch nicht verändert. |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Condylomata acuminata.**

Vulva und Aditus vaginae 3 Minuten mit Tampon gereinigt.

|              |                                             |       |
|--------------|---------------------------------------------|-------|
| 5. 2 Gläser. | 2 +, 4. Tg.<br>verschiedenartige<br>Coccen. | Weib. |
|--------------|---------------------------------------------|-------|

**Condylomata acuminata.**

Drei Minuten mittelst Tampon bearbeitet.

|              |                                            |       |
|--------------|--------------------------------------------|-------|
| 6. 7 Gläser. | 2 +, 2. Tg.<br>1 +, 6. Tg.<br>1 +, 10. Tg. | Mann. |
|--------------|--------------------------------------------|-------|

**Elephantiasis labii majoris.**

Umgebung der Vulva (mittelst gewöhnlichen Seifenschaumes) rasirt, mit sterilem Wasser abgespült. Circa 4 Minuten lange Reinigung mit Tampon.

|              |                |                  |
|--------------|----------------|------------------|
| 7. 3 Gläser. | 2 +, 2.—3. Tg. | 30jähriges Weib. |
|--------------|----------------|------------------|

So klein auch die Anzahl der Untersuchungen auf diesem Gebiete ist, so genügen dieselben doch, um zu zeigen, dass die Frage stehende Körperregion der Säuberung durchaus nicht solche Schwierigkeiten entgegensetzt, als man glauben möchte. Wenn nur die beiden vor den Bubonenoperationen ausgeführten Waschungen haben völlige Misserfolge ergeben. Dass dieser Misserfolg dem Reichthum der Leistengegend an Haarfollikeln zuzuschreiben ist, lassen noch zur Veröffentlichung kommende Versuche von Herrn Professor Dr. Neisser und Herrn Dr. Jadasohn wahrscheinlich erscheinen, nach welchen sich Mikroorganismen in den Haarwurzeln besonders festnisten und hier sehr schwer zuzugreifen sind; alsdann kämen jene schlechten Resultate nicht in Betracht für Fälle, in denen nur eine oberflächliche Reinigung genöthigt wird. Der Wahl der angewandten Desinfectionsmethode kann ich keine Bedeutung beilegen, da dieselbe weder bei den Leichen-, noch bei den folgenden Versuchen eine eigenartige und merkwürdige Wirkungskraft entfaltet hat.

---

Trotzdem sich die Desinfection vor einer Operation, respective nach einer Infection, nicht nur auf die Hände, sondern auch immer auf die Unterarme erstreckt, ist bisher stets lediglich der erste Act einer experimentellen Untersuchung gewürdigt worden. Ich glaube, mit Unrecht. Freilich braucht nicht erst bewiesen zu werden, dass jedes Desinfectionsverfahren, welches für die Hände erprobt ist, auch für den Unterarm ausreicht; es hat doch aber gewiss ebenfalls praktischen Werth, zu wissen, wieviel leichter letzterer zu reinigen ist. Es wird deshalb, hoffe ich, nicht für überflüssig gehalten werden, wenn ich, ehe ich zu dem Haupttheil der Arbeit, der Desinfection der Hände komme, noch kurz bei diesem Punkte verweile. Anhangsweise führe ich einige an pathologischen Objecten angestellte, vergleichshalber ausgeführte Versuche auf.

Das Material zur Beschickung der Culturgläser — an Stelle der bisher benützten excidirten Hautstückchen — wurde hier durch Abraspeln des (präparirten) Armes mit einem schmalen, steilen, völlig (wie Controlversuche feststellten) sterilisirten Spatel und Uebertragung der an demselben haften gebliebenen Massen

auf den Nährboden gewonnen. Als Versuchsobjecte dienten die Unterarme zweier Personen mit glatter, weicher, wenig behaarte Haut; die Sauberkeit war schwankend, weshalb sich darauf bezügliche Bemerkungen bei den einzelnen Versuchen finden. Einigemale wurde statt des Unterarmes — aus äusseren Gründen — der Oberarm gewählt, welcher in allem Wesentlichen gleichen Verhältnisse bot.

### **Zehnprocentiger Carbolseifenspiritus.**

3 Minuten (unter Zuhilfenahme von gewöhnlichem, kaltem Wasser) gebürstet, mit sterilem Wasser abgespült, mit Aether getrocknet.

|               |                 |                                                                                                 |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 10 Gläser. | 1 + am 3. Tage. | Haut wenig sauber. Sieben von unpräparirten Arm entnommen. Präparate gaben sämmtlich Wachsthum. |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Einprocentiger Thymolseifenspiritus.**

2—3 Minuten gebürstet etc.

|              |             |                         |
|--------------|-------------|-------------------------|
| 2. 8 Gläser. | 3 +, 3. Tg. | Haut nicht ganz sauber. |
| 3. 10 „      | 10 —        | Haut sauber.            |

### **Seifenspiritus.**

3 Minuten gebürstet etc.

|              |                |                         |
|--------------|----------------|-------------------------|
| 4. 8 Gläser. | 5 +, 4.—8. Tg. | Haut nicht ganz sauber. |
|--------------|----------------|-------------------------|

### **Einprocentiger Thymolalkohol.**

Circa 2 Minuten (ohne Wasser) leicht gebürstet, abgespült

|               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| 5. 10 Gläser. | 10 — | Desgleichen. |
|---------------|------|--------------|

### **Dreiprocentiges Crèolinwasser.**

3 Minuten gebürstet etc.

|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| 6. 10 Gläser. | 3 +, 3 Tg. | Desgleichen. |
|---------------|------------|--------------|

### **Fünfprocentiges Carbolöl.**

2—3 Minuten mittelst Tampon eingerieben.

|              |            |              |
|--------------|------------|--------------|
| 7. 4 Gläser. | 4 +, 2 Tg. | Haut sauber. |
|--------------|------------|--------------|

**Aether sulfuricus.**

2—3 Minuten mittelst Tampon gereinigt.

3. 6 Gläser. | 1 +, 3 Tg. | Haut sauber.

**Alkohol absolutus.**

2—3 Minuten Tampon.

9. 6 Gläser. | 6 — | Haut sauber.

**Fünfprocentiges Carbolöl — Aether.**

Das Oel circa 2 Minuten mittelst Tampon eingerieben, mit Aether wieder abgewaschen.

0. 8 Gläser. | 2 +, 2.—3. Tg. | Haut sauber.

**Fünfprocentiges Carbolöl — Alkohol absolutus.**

Wie beim vorigen.

1. 10 Gläser. | 10 — | Haut sauber.

**Ol. Terebinthinae — Aether.**

Wie beim vorigen.

2. 11 Gläser. | 1 +, 4 Tg. (1 Herd) | Haut weniger sauber.

**Kaltes Wasser und Natronseife.**

1 Minute leicht gebürstet.

3. 5 Gläser. | 5 +, 2.—6. Tg. | Haut sauber.

3 Minuten gebürstet, mit sterilem Wasser abgespült, getrocknet.

4. 10 Gläser. | 7 +, 2.—4. Tg. | Haut nicht ganz sauber.

**Mit kaltem Wasser und Natronseife**

zur Entfernung des sichtbaren Schmutzes circa 1 Minute leicht gebürstet, darauf mit

*saurem Sublimat,*

15. 5 Gläser. | 5 —

*3%igem Creolinwasser,*

16. 5 Gläser. | 5 —

*3%igem Carbolwasser*17. 10 Gläser. | 1 + am 3. Tg.  
(1 Herd; lange  
Bacillenfäden.)

abgespült.

Haut ziemlich sauber.

## Anhang.

A. *Herpes tonsurans der Oberextremität und des Kopfes.*

- a) Arm, wenig schuppig, nachdem ein Präparat von ihm entnommen, welches Wachsthum erzeugte, mit einprocentigen Thymolseifenspiritus (und kaltem Wasser) mittel Wattetampons 4 Minuten lang gewaschen, mit sterilen Wasser abgespült, durch sterilen Verband (die einzelnen Verbandstücke im Wasserdampf sterilisirt) dicht abgeschlossen. Nach 40 Stunden der Verband entfernt, die inzwischen wieder gebildeten Schüppchen auf Agar-Agar gebracht.

5 Gläser. | 2 + am 5. Tage. |  
                   (In 1 Glase nur  
                   1 Herd.)

- b) Kopf, reichlich mit Schuppen bedeckt, nachdem sieben Präparate entnommen, welche alle am 2. und 3. Tage Wachsthum ergaben, durch Oelverband (30 Stunden gelegen) von den Schuppen befreit. Alsdann ebenso wie der Arm gereinigt und verbunden. Nach 40 Stunden:

10 Gläser. | 10 + am 5. Tage. |

Bemerkt muss werden, dass der Verband am Kopfe keinen so vollkommenen Abschluss bot, wie am Arm.

Anmerkung. Am passendsten berichte ich wohl hier über zwei am Kopfe einer gesunden Person ausgeführte Waschungen.

1. *Carbolseifenspiritus 10·0:100·0.*

5 Minuten lang mit Tampon (unter Wasserzusatz) gereinigt, abgespült etc.

5 Gläser. | 1 +, 3. Tg.

2. *Thymolseifenspiritus 1·0:100·0.*

2 Minuten langes, leichtes  
Bürsten.

10 Gläser. | 10 —

} Zarte, saubere Haut; langes und  
 dichtet, weiches Haar; wenig  
 Schuppen.

B. *Psoriasis, Arm und Kopf; mit vielen Efflorescenzen.*

Der rechte Oberarm mit Thymolwasser 1·0:1200·0

„ „ Unterarm „ Borwasser 4·0:100·0

Der linke Oberarm mit wässeriger essigsaurer Thonerdelösung 20:1000  
 „ „ Unterarm „ Sublimatwasser 10:50000  
 „ Kopf „ Pyrogallussalbe 100:1000  
 verbunden.

Nach 24 Stunden Verband abgenommen. Von den affigierten, stark macerirten Stellen mit Hilfe einer sterilisirten Platindel bald mehr oberflächlich, bald mehr aus der Tiefe, Präparate entnommen, auf Agar-Agar gebracht. Verband in der gleichen Weise erneuert.

Nach  $2 \times 24$  Stunden abermals Präparate entnommen; darauf wieder verbunden.

Nach  $3 \times 24$  Stunden zum dritten Mal abgeimpft:

|                                                  | 24 Stunden | $2 \times 24$ St. | $3 \times 24$ St.        |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Rechter Oberarm, Thymolwasser 1/1200 . . . . .   | 9 +, 0 -   | 8 +, 0 -          | 6 +, 0 -                 |
| „ Unterarm, Borwasser 4/100 . . . . .            | 7 +, 3 -   | 2 +, 6 -          | 6 +, 0 -                 |
| Linker Oberarm, essigs. Thonerde 2/100 . . . . . | 2 +, 8 -   | 2 +, 6 -          | 3 +, 3 -<br>(sehr wenig) |
| „ Unterarm, Sublimat 1/5000 . . . . .            | 7 +, 4 -   | 1 +, 9 -          | 1 +, 5 -                 |
| pf, Pyrogallussalbe 10/100 . . . . .             | 2 +, 8 -   | 1 +, 7 -          | 2 +, 3 -                 |

Die Resultate am normalen Arm sind durchaus eindeutig. Eine ausreichende Desinfection ist hier mühelos und schnell zu erreichen. Die üblichen Antiseptica wirken alle prompt und ohne dass ihnen erst der Weg durch langwierige Vorbereitung geebnet wird. Die Entfernung der Mikroorganismen gelingt auch ohne Anziehung der Antiseptica; aber nicht — wenigstens nicht leicht — mit Wasser und Seife oder Seifenspirit, sondern mit Alkohol und Aether; ob die Wirkung dieser Mittel durch vorangegangene Anwendung eines (Carbol- und Terpentin-) Oeles erleichtert wird, ist nicht erwiesen, weil sie eben schon allein einen raschen und vollkommenen Effect ergaben.

Wie viel schwieriger liegen die Verhältnisse an der Hand!

Als Prüfungsmethode benützte ich sowohl die gewöhnliche, nach Kümmell und Forster geübte, als auch, nach dem Ertheilen der Fürbringer'schen Arbeit, die von Letzterem publicirte. Beide freilich mit kleinen Modificationen. Die grösseren Schalen und Töpfe nämlich mit Nährmasse, in welche man mit

der ganzen Hand hineinfahren konnte, ersetzte ich durch weit kürze Reagentsgläser, welche zwar nur für je einen Finger zugänglich waren, aber durch den viel sichereren Abschluss (Watt) bezüglich der Genauigkeit des Verfahrens in die Augen springenden Vortheile boten.

An Stelle der von Fürbringer gebrauchten Drahtstift und Streichhölzer bediente ich mich eines an der Spitze und an den Rändern abgestumpften, schmalen, festen, vollkommen sterilisirten Scalpells, mit welchem ich den Unternagelraum (im Fürbringer'schen Sinne) recht gründlich ausräumte und alsdann den — festen — Nährleim <sup>1)</sup> durchfurchte, alles, was an dem Scalpell haften geblieben war, an dem Leim abstreifend. Auch von verschiedenen Theilen der Fingerfläche, darunter besonders von der Gegend des Nagelfalzes, entnahm ich in analoger Weise Präparate. Die Möglichkeit, einzelne Partien der Finger in stricter Trennung zu erforschen, halte ich für einen Vorzug der Fürbringer'schen Technik. Grössere Exactheit dagegen im Allgemeinen kann ich ihr nach meinen Erfahrungen durchaus nicht zugestehen. Die folgende Tabelle bietet Gelegenheit zum Vergleich Controlversuche am undesinfectirten Finger gaben entsprechend Resultate. Möglich, dass auch nach der Kummell'schen Methode die Nährmasse weniger von dem Keimgehalt der Hand annimmt, als es Körperflüssigkeiten bei viel längerem Contact thun; wesentlich dürfte der Unterschied kaum sein, wenn man den Finger nur recht sorgsam in den Leim eingräbt; und wenn man nur sonst recht kritisch verfährt, unter möglichst strengen Voraussetzungen arbeitet, so braucht man das Ergebniss der Resultate nicht allzu ein zu günstiges zu betrachten.

Das Abtrocknen der Finger vor der Prüfung habe ich stets gleich Kummell, unterlassen, eben schon deshalb, weil eine feuchte Hand von ihren Anhängseln eher mehr an das Agar-Agar abgibt, als eine trockene; und nur das Gegentheil könnte eine Veranlassung sein, etwas zu thun, was den praktischen Vorgängen — Agiren mit feuchten Händen — nicht entspricht. Der Streitfrage, wie vorbereitete Handtücher man zum Abtrocknen nehmen müsse, war ich freilich so auch am bequemsten überhoben.

---

<sup>1)</sup> Die Zusammensetzung ist die gleiche, wie oben angegeben.

Die Culturen wurden immer zur schnelleren Entwicklung im Brütofen übergeben.

Leider hatte ich keine Gelegenheit, wie Kümmell und Fürbringer, durch inficirende Operationen oder Sectionen meine Hände — fast sämtliche Untersuchungen beziehen sich auf meine eigenen Hände; natürlich wurden erstere in genügend grossen Zwischenräumen vorgenommen, als dass sie etwa die Gleichmässigkeit des Objects hätten gefährden können — vor der controlirenden Reinigung zu belasten. Immerhin aber sind dieselben häufig genug vor der Desinfection durch Arbeiten im Sectionssaal des pathologischen Institutes und in einem Raume, welchem sich zur Infection mit pathogenen Mikroorganismen vielfache Veranlassung bot, in einer Weise verunreinigt worden, dass darin ein ausreichendes Aequivalent liegen dürfte. Die Folge wird noch des weiteren ergeben, ob der angezogene Umstand die Erwerthbarkeit meiner Versuche beeinträchtigt, welche ich nachstehend aufführe.

*Saures Sublimat.*

Die Finger darin, nach leichter, oberflächlicher Waschung mit kaltem Wasser und Seife, für eine Minute eingetaucht.

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. 2 Gläser <sup>1)</sup>   2 +, 3. Tg. | <sup>1)</sup> Die beschriebenen kurzen, dicken Reagensgläser. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

*Alkohol absolutus — saures Sublimat.*

Wie beim vorigen; je eine Minute.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 2. 2 Gläser.   2 +, 3. Tg. |  |
| (eines sehr wenig)         |  |

*Thymolalkohol 1·0 : 100·0.*

Nach leichter Waschung, wie vorher, mit Tampon abgerieben.

|                      |  |
|----------------------|--|
| 3. 1 Glas.   1 —     |  |
| 2 Minuten gebürstet. |  |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 4. { 5 F. <sup>1)</sup>   1 + | } 3 Tg. |
| { 5 U.   5 +                  |         |

<sup>1)</sup> Nach der (modificirten) Fürbringer'schen Methode entnommene Präparate; U.: aus dem Unternagelraum, F.: von den übrigen Theilen des Fingers. Analog bei allen übrigen Versuchen!

*10%iger Carbolseifenspiritus.*

5 Minuten damit (unter Zusatz von kaltem Wasser) gebürstet, mit sterilem Wasser abgespült.

|              |             |
|--------------|-------------|
| 5. 4 Gläser. | 3 +, 3. Tg. |
|              | 1?          |
| 6. 3 Gläser. | 3 +, 3. Tg. |
| 7. 6 " "     | 6 +, 2. Tg. |

*1%iger Thymolseifenspiritus.*

2 Minuten gebürstet etc., wie beim vorigen Versuch.

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 8. { 5 F. | 10 +, 2.—3. Tg. |
| 5 U.      |                 |

**Warmes Wasser und Seife — Desinficiens.**

. . . Minuten mit ersterem, . . . Minuten mit letzterem gewischt und gebürstet.

*5%iges Carbolwasser.*

5 Minuten — 2 Minuten.

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 9. 5 Gläser. | 5 +, 2. Tg.                                                |
|              | (Kaliseife). vorwiegend Bacillen und Sporen, wenig Coccen. |
| 10. 6 " "    | 5 +, 2.—3. Tg.                                             |
|              | nur Bacillen mit Sporen.                                   |

Das Wasser wurde so warm gewählt, als es die Hand vertrug.

Wo nicht anders angegeben, wurde Natronseife angewendet.

Die Unternagelräume während des Waschens sowohl mit Hilfe der Nägel der anderen Hand, als auch mittelst des Falzes der Nagelbürstegesäubert. Das Bürsten der Hand geschah stets sehr energisch, vornehmlich an den Fingerspitzen. Die Nägel waren ziemlich kurz gehalten.

*3%iges Carbolwasser.*

3 Minuten — 2 Minuten.

|            |                |
|------------|----------------|
| 11. { 5 F. | 5 —            |
| 5 U.       | 5 +, 2.—4. Tg. |

*3%iges Creolinwasser.*

5 Minuten — 2 Minuten.

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 12. 6 Gläser. | 6 +, 2. Tg.                      |
|               | nur Staphylococcus cereus albus. |

*Saures Sublimat.*

5—2 Minuten.

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 3. 6 Gläser. | 6 +, 2.—4. Tg.<br>nur Coccen.                    |
| 4. 6 Gläser. | 2 +, 2. Tg.<br>(in einem Glase nur<br>ein Herd.) |

4—2 Minuten.

|                |     |             |
|----------------|-----|-------------|
| 5. { 5 Gläser. | 5 + | } 2.—4. Tg. |
| 5 F.           | 5 — |             |
| 5 U.           | 5 + |             |

3—2 Minuten.

|                |                                                           |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 6. { 5 F.      | 1 +                                                       | } 2.—4. Tg.      |
| 5 U.           | 5 +                                                       |                  |
| 7. { 8 F.      | 8 —                                                       | } 2.—4. Tg.      |
| 8 U.           | 1 +, 3. Tg.                                               |                  |
| 8. { 10 F.     | 10 —                                                      | } 2.—4. Tg.      |
| 10 U.          | 8 +, 2.—4. Tg.                                            |                  |
| 9. { 6 Gläser. | 4 +, 4.—9. Tg.<br>(darunter bei zweien<br>nur je 1 Herd.) | } 2.—4. Tg.      |
| 3 F.           | 3 —                                                       |                  |
| 3 U.           | 2 +, 5. Tg.                                               |                  |
| 10. 4 Gläser.  | 4 —                                                       | } 2 +, 3.—5. Tg. |
| 1. 3 "         | 1 +, 8. Tg. (1 Herd).                                     |                  |
| 2. 7 "         | 1 +, 3. Tg. (1 Herd).                                     |                  |

*1<sup>0</sup>/iger Sublimatalkohol.*

3—2 Minuten.

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 3. { 20 F. | 1 +, 5. Tg. (1 Herd).               |
| 20 U.      | 1 +, 10. Tg.<br>(1 Herd: Schimmel.) |

*1<sup>0</sup>/<sub>100</sub>iger Sublimatalkohol.*

3—2 Minuten.

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 4. { 10 F. | 2 +, 9. u. 10. Tg. |
| 10 U.      | 10 —               |
| 5. { 10 F. | 20 —               |
| 10 U.      |                    |

Anmerkung. Die Bürsten wurden in absolutem Alkohol aufbewahrt. Eine bacterioskopische Prüfung desselben, nachdem er schon mehrere Wochen in Gebrauch war, ergab seine völlige Keimfreiheit. Bei nochmaliger Controle zu anderer Zeit ergab sich das gleiche Resultat. Im Anschluss daran untersuchte ich noch folgende Flüssigkeiten:

Aether sulfuricus,  
Terpentinöl,  
5<sup>0</sup>/iges Carbolöl,  
3<sup>0</sup>/iges Carbolwasser,  
5<sup>0</sup>/iges Carbolwasser,  
3<sup>0</sup>/iges Creolinwasser,  
Saures Sublimat,  
Seifenspiritus,  
10<sup>0</sup>/igen Carbolseifenspiritus,  
1<sup>0</sup>/igen Thymolseifenspiritus,  
1<sup>0</sup>/igen Thymolalkohol,  
Wasserleitungswasser (Breslau).

Bei Leitungswasser zeigten von 5 Gläsern 2 je einen Herd; bei 3<sup>0</sup>/igem Carbolwasser von 30 Gläsern (verschieden alte Lösungen) eines einen Herd von Stäbchen und vielen Sporen.

Bei 5<sup>0</sup>/igem Carbolwasser desgleichen (sehr lange Bacillenfäden, spärliche Sporen).

Alle übrigen Gläser blieben steril.

*Thymolwasser 1:0:1200:0.*

3—2 Minuten.

- |     |        |                                                                        |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 26. | { 5 F. | 10 +, 2.—5. Tg.<br>(bei einzelnen sehr<br>beschränktes Wachs-<br>thum) |
|     | { 5 U. |                                                                        |

5—2 Minuten.

- |     |         |                                                           |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------|
| 27. | { 12 F. | 9 + { 2.—3. Tg.<br>(stellenweise<br>sehr be-<br>schränkt) |
|     | { 12 U. |                                                           |

*1%iger Thymolalkohol.*

3—2 Minuten.

- |     |        |      |
|-----|--------|------|
| 28. | { 5 F. | 10 — |
|     | { 5 U. |      |

*<sup>1</sup>/<sub>12</sub>%iger <sup>1</sup>) Thymolalkohol.*

3—2 Minuten.

- |     |         |      |
|-----|---------|------|
| 29. | { 10 F. | 20 — |
|     | { 10 U. |      |

- |     |         |      |
|-----|---------|------|
| 30. | { 10 F. | 20 — |
|     | { 10 U. |      |

*Alkohol absolutus.*

3—2 Minuten.

- |     |        |      |
|-----|--------|------|
| 31. | { 5 F. | 10 — |
|     | { 5 U. |      |

- |     |        |      |
|-----|--------|------|
| 32. | { 5 F. | 10 — |
|     | { 5 U. |      |

- |     |         |      |
|-----|---------|------|
| 33. | { 10 F. | 10 — |
|     | { 10 U. |      |

1 +, 4. Tg.

Seifenspiritus und warmes Wasser — Desinficiens.

... Minuten mit ersterem, ... Minuten mit letzterem  
geweicht und gebürstet.

*5%iges Carbolwasser.*

3—2 Minuten.

- |     |           |                |
|-----|-----------|----------------|
| 34. | 5 Gläser. | 3 +, 3.—5. Tg. |
|-----|-----------|----------------|

5—2 Minuten.

- |     |           |             |
|-----|-----------|-------------|
| 35. | 3 Gläser. | 3 +, 2. Tg. |
|-----|-----------|-------------|

<sup>1</sup>) Analog dem <sup>1</sup>/<sub>12</sub>%igen Thymolwasser (Thymol löst sich in Wasser bekanntlich nur von diesem Verhältniss an abwärts).

*Saures Sublimat.*

3—2 Minuten.

|               |                |
|---------------|----------------|
| 36. 5 Gläser. | 5 +, 2.—3. Tg. |
| 37. { 5 F.    | 5 —            |
| { 5 U.        | 5 +, 2.—5. Tg. |

5—2 Minuten.

|               |                |
|---------------|----------------|
| 38. 3 Gläser. | 3 +, 2.—5. Tg. |
|---------------|----------------|

*Saures Sublimat — 1<sup>0</sup>/<sub>10</sub>iger Thymolalkohol.*

3—2—2 Minuten.

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 39. { 5 F. | 1 +, 2. Tg. (1 Herd) |
| { 5 U.     | 5 —                  |

*1<sup>0</sup>/<sub>10</sub>iger Thymolalkohol.*

3—2 Minuten.

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 40. 4 Gläser. | 3 +. 4.—8. Tg.<br>(in einem nur<br>1 Schimmelherd) |
| 41. { 5 F.    | 10 —                                               |
| { 5 U.        |                                                    |

**Vorbereitung unter Zuziehung von Alkohol nach Fürbringer.**

... Minuten mit warmem Wasser und Seife, ... Minuten mit Alkohol absolutus (mindergradiger nicht benützt), ... Minuten mit dem Desinficiens geweicht und gebürstet.

*Saures Sublimat.*

Je 1 Minute.

|                |   |           |   |                               |            |
|----------------|---|-----------|---|-------------------------------|------------|
| 42.            | { | 10 F.     |   | 1 +                           | } 3 Tg.    |
|                |   | 10 U.     |   | 1 +                           |            |
| 3—1—1 Minute.  |   |           |   |                               |            |
| 43.            | { | 5 F.      |   | 3 +, 4                        | Tg.        |
|                |   | 5 U.      |   | 3 +, 2.—4.                    | Tg.        |
| 3—1—2 Minuten. |   |           |   |                               |            |
| 44.            | { | 5 Gläser. | { | 2 +, 3.                       | Tg.        |
|                |   |           |   | (Stäbchen und viel<br>Sporen) |            |
|                |   |           |   | 1 +, 5                        | Tg.(1Herd) |
|                |   |           |   | 10 —                          |            |
|                |   | 10 F.     |   | 10 —                          |            |
|                |   | 10 U.     |   | 2 +, 3.                       | Tg.        |
|                |   |           |   | (je 1 Herd)                   |            |

Die folgenden Versuche haben mit Ausnahme des ersten mit den Fürbringer'schen Waschungen allerdings nur die Anwendung des Alkohols gemein, nicht die Zeitersparniss:

„Die Hände allenthalben mit Seife und recht warmem Wasser gründlich abzubürsten, insbesondere die Unternagelräume zu bearbeiten (Fürbringer, Seite 37)“ war mir binnen einer Minute schlechterdings unmöglich.

45. { 8 F. | 16 — |  
       { 8 U. |

3—2—2 Minuten.

46. { 10 F. | 1 +, 6. Tg. |  
       { 10 U. | 10 — |

5%iges Carbolwasser.

3—1—1 Minute.

47. 3 Gläser. | 2 +, 2. u. 3. Tg. |  
                   (vorwiegend Coccen)

3%iges Carbolwasser.

5—1—2 Minuten.

48. { 12 F. | 12 — |  
       { 12 U. | 8 +, 2.—4. Tg. |

### Einfetten der Hand vor der Desinfection.

5%iges Carbolöl.

Finger damit abgerieben.

49. 5 F. | 4 +, 2. Tg. |  
                   sehr reichlich

5%iges Carbolöl — Aether sulfuricus.

Finger in ersteres eingetaucht, dann mit Aether abgerieben.

50. 1 Glas. | 1 +, 2. Tg. |

51. 5 F. | 5 — |

5%iges Carbolöl — Alkohol absolutus.

Wie vorher.

52. 6 Gläser. | 6 +, 2.—3. Tg. |

Oleum terebinthinae. — Aether sulfuricus.

Wie vorher.

53. 1 Glas. | 1 +, 2. Tg. |

5%iges Carbolöl — Seifenspiritus und warmes Wasser.

Die Hand mit ersterem eingefettet, mit letzterem 3 Minuten gewechselt und gebürstet.

54. { 5 F. | 10 +, 2.—4. Tg. |  
       { 5 U. |

5%iges Carbolöl — Thymolseifenspiritus und Wasser.

Wie vorher.

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 5. 2 Gläser. | 2 +, 2. u. 3. Tg.  |
|              | (fast nur Staphyl. |
|              | cereus albus)      |

5%iges Carbolöl — Alkohol absolutus — saures Sublimat.

Finger in jedes je 1 Minute eingetaucht.

|              |             |
|--------------|-------------|
| 6. 2 Gläser. | 2 +, 2. Tg. |
|--------------|-------------|

5%iges Carbolöl — Seifenspiritus und warmes Wasser — saures Sublimat.

Hände ordentlich eingeölt, dann 5 Minuten mit dem Seifenspiritus und 2 Minuten mit Sublimat geweicht und gebürstet.

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 7. { 10 F. | 2 +, 3 Tg.          |
|            | (in einem Glase nur |
|            | 1 Herd)             |
| { 12 U.    | 5 +, 2.—4. Tg.      |

Glycerin — warmes Wasser und Seife — saures Sublimat.

Wie beim vorigen, aber

2—2 Minuten.

|                |             |
|----------------|-------------|
| 8. { 5 Gläser. | 5 +, 3. Tg. |
| { 5 F.         | 5 —         |
| { 5 U.         | 2 +, 3. Tg. |

5—2 Minuten.

|            |            |
|------------|------------|
| 9. { 20 F. | 1 +, 4 Tg. |
| { 20 U.    | 1 +, 6 Tg. |

Lanolin — warmes Wasser und Seife — saures Sublimat.

Ebenso;

3—2 Minuten.

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 0. 5 Gläser. | 5 —                |
| 1. 4 „       | { 3 +, 2.—4. Tg.   |
|              | (mässiges          |
|              | Wachsthum)         |
|              | { 1 + am 6. Tg.    |
|              | (ein erbsengrosser |
|              | Herd)              |
| 2. 6 „       | 6 —                |

## Anhang.

a) von vier verschiedenen Personen, liess

|              |                |               |                |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| A. 5 Minuten | seine Hände in | mit Kaliseife | und warmem     |
| B. 10 "      | warmem         | " Natronseife | Wasser je zwei |
| C. 15 "      | Wasser wei-    | " Kaliseife   | Minuten —      |
| D. 20 "      | chen: je zwei  | " Natronseife | ohne Bürste    |
|              | Gläser be-     |               | gewaschen;     |
|              | schickt.       |               | je zwei Prä-   |
|              | Darauf         |               | parate.        |

Bis zum 3. Tage überall Wachsthum, welches spärlich blieb.

b) die Hände.

|                                   |          |                   |
|-----------------------------------|----------|-------------------|
| 5 Minuten in warmem Wasser ge-    |          | 4—3: Zahlreiche,  |
| weicht . . . . .                  | 1., 2.   | aber feine Stipp- |
| darauf 2 Minuten mit warmem       |          | chen.             |
| Wasser und Natronseife ge-        |          | 4—7: Spärliches   |
| waschen, leicht gebürstet . . .   | 3., 4.   | Wachsthum.        |
| darauf wieder 5 Minuten in warmem |          | 8—22: Reichliche  |
| Wasser geweicht . . . . .         | 5., 6.   | Entwicklung.      |
| 2 Minuten mit Seife behandelt . . | 7., 8.   |                   |
| in gleicher Weise weiter . . . .  | 9., 10.  |                   |
| (vor dem Eintauchen in das        | 11., 12. |                   |
| Culturglas die Hände jedesmal     | 13—15.   |                   |
| mit sterilem Wasser abgspült)     | 16—18.   |                   |
| zum Schluss 2 Minuten langes Ein- |          |                   |
| tauchen in saures Sublimat . .    | 19—22.   |                   |

c) die Hände.

|                                     |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| 5 Minuten mit warmem Wasser         |          |                   |
| und Seife gewaschen und ge-         |          |                   |
| weicht, mit sterilem Wasser ab-     |          |                   |
| gspült . . . . .                    | 1—3.     |                   |
| darauf 5 Minuten nochmals das-      |          | 1—13: reichliche  |
| selbe . . . . .                     | 4—6.     | Entwicklung       |
| darauf 2 Minuten in saures Sublimat |          | (12 am wenigsten  |
| getaucht . . . . .                  | 7—9.     | reichlich).       |
| darauf 3 Minuten mit warmem         |          |                   |
| Wasser und Seife gebürstet, ab-     |          |                   |
| gspült . . . . .                    | 10—13.   |                   |
| darauf wieder 2 Minuten in saures   |          |                   |
| Sublimat getaucht . . . . .         | 14., 15. | Spärliches Wachs- |
| resp. 2 Minuten mit saurem          |          | thum.             |
| Sublimat gebürstet . . . . .        | 16., 17. | 16 frei.          |
|                                     |          | 17 am 5. Tage     |
|                                     |          | einige Herde.     |

Wo nichts Besonderes notirt ist, lieferten die Culturen verschiedenartige Gemenge der mannigfachsten Coccen- und Bacillenformen, in deren Charakter eine Beziehung zu den angewandten Desinfectionsmethoden nicht hervortrat. Detaillirte Aufzeichnung der diesbezüglichen Befunde konnte ich deshalb unterlassen, weil sie nur für Diejenigen Interesse hätte, welche von einer ausreichenden Desinfection nicht die Vernichtung aller, sondern nur der gefährlichen Keime verlangen: eine — wie Fürbringer ausgeführt hat — wohl streng logische, aber nicht praktische Forderung.

Die relativ meisten Versuche habe ich der Desinfection mit warmem Wasser, Seife und Sublimat unter umfassendem Gebrauche der Bürste und Zugrundelegung der üblichen Zeitmasse — ich benützte ausschliesslich, wegen der ihm vor dem gewöhnlichen zustehenden Vorzüge, das von Laplace empfohlene saure Sublimat — gewidmet, weil es das bisher am meisten übliche Verfahren ist, welches auch nicht ohne gute Gründe verlassen werden möchte. Ein Blick auf die Tabelle lehrt nun, dass ich freilich nicht gleich Forster behaupten kann, mit genanntem Verfahren sehr glänzende Erfolge erzielt zu haben. Begnügen wir uns zunächst mit der Constatirung dieser Thatsache ohne weitere Erörterung, und sehen wir, wie sich die anderen Methoden zeigen! Die Ersetzung des Sublimates durch Carbolwasser bot nichts weniger als Vortheile; ich will meine Carbolversuche jedoch nicht als ganz gleichwerthig mit den übrigen betrachten, weil ich in dem Gefühle, Carbolsäure sehr schlecht zu vertragen, mit demselben vielleicht weniger energisch gearbeitet habe, als mit anderen Mitteln — daher auch die spärliche Anwendung desselben. Das starke Macerationsvermögen der wässerigen Carbollösungen lässt ja doch eine intensive Wirkung derselben, wie sie Kümmell gesehen, als natürlich erscheinen; allerdings eine zweideutige Empfehlung! — Der mit alkoholischen Lösungen von Sublimat und Thymol erzielte ziemlich vollkommene Effect dagegen könnte auffallen — wenn es nur nicht Argwohn erregen müsste, dass dasselbe Resultat mit purem Alkohol absolutus erreicht wurde, während die Resultate sich verschlechterten, sobald ich der beinahe gleichen Waschung Desinfection mit einer wässerigen Sublimat- oder Carbollösung folgen liess! Ich möchte die Scheinerfolge — so muss ich sie bezeichnen — damit erklären,

dass die alkoholischen Lösungen die Haut sehr stark austrocknen und dadurch die Entnahme der Präparate nach der Fürbringer'schen Art erschweren, ebenso wie sie die Cohäsion zwischen Finger und Nährleim bei der anderen Prüfungsmethode (bei den einschlägigen Versuchen ist nur die Fürbringer'sche zur Anwendung gekommen) beeinträchtigen würden. Abspülen mit sterilem Wasser schafft dabei keine Abhilfe. Ich habe den Gegenstand nicht weiter verfolgt, weil ich mir keinen praktischen Nutzen davon versprach. Die alkoholischen Lösungen von Desinficientien müssten schwerwiegendere Vortheile, als man von ihnen erwarten darf, bieten, um die ihnen anhaftenden Nachtheile wettzumachen; denn Sprödigkeit der Haut, Stumpfheit der Finger, Kribbelgefühl, wie sie es unmittelbar hervorrufen, erschweren jegliche Thätigkeit, zumal operative; die Kostspieligkeit ist wesentlich. Dieselben Mängel sind auch den Fürbringer'schen Waschungen nachzusagen. Ich dürfte auf die durch den Alkohol erzeugten Parästhesien weniger Werth legen, wenn ich nicht gleichlautende Klagen von verschiedentlichen Seiten gehört hätte. Eine Bürgschaft für die Sicherheit des Erfolges konnte ich in der Zuziehung des Alkohols nicht finden, selbst wenn ich von vornherein auf die von Fürbringer sehr betonte Zeitersparniss verzichtete, wenn ich trotz des Alkohols die Benützung von Wasser, Seife und Bürste nicht einschränkte, weil mir eine nur eine Minute damit bearbeitete Hand zu wenig vertrauenerweckend aussah.

Wasser, Seife (Kaliseife) und Alkohol zusammen in der Form des Seifenspiritus zur Anwendung zu bringen, lässt sich nach meinen Erfahrungen nicht empfehlen. Die sonst so kräftige Wirkung der Kaliseife scheint durch das Zusammenbringen mit Alkohol geradezu abgeschwächt zu werden, vielleicht, weil die quellenden Eigenschaften des einen und die schrumpfenden des anderen Mittels in Antagonismus stehen. Gleichfalls nicht bewährt haben sich die Verbindungen der Antiseptica mit Seifenspiritus, deren Gebrauch an Bequemlichkeit nichts zu wünschen gelassen hätte.

Zu der Probe, ob die Desinfection der Hände durch Einfetten derselben zu erleichtern sei, bin ich durch den Erfolg veranlasst worden, welchen, wie früher bemerkt, die combinirte Anwendung von Oelen, resp. Fetten und Aether gehabt. Er erschien

malen plausibel genug: Die durch das Einölen erweichte Hand abt schneller ihre Unreinlichkeiten ab, zumal eben an den Aether, dessen Beziehungen zu öligen Stoffen ja bekannt sind.

Am Arm des Lebenden konnte ich diesbezügliche Beobachtungen nicht machen, weil hier schon Aether und Alkohol (welcher letzterer theilweise, entschieden ohne Nachtheil, für ersteren substituiert worden war) allein zu gut wirkten. An der Hand war ein solcher Uebelstand nicht zu beklagen; dagegen benötigte es kaum einer bacterioskopischen Prüfung, um zu zeigen, dass dem fraglichen Verfahren allenfalls die glatten Flächen der Finger zugänglich waren, die Unternagelräume aber völlig widerstanden. Die Modification Carbolöl-Seifenspiritus erwies sich nicht besser. In Folge dessen verzichtete ich hier auf die so vielversprechende Combination von Oel und Aether-Alkohol, und liess nun, lediglich in der Erweichung der Haut, in ihrem Geschmeidigwerden durch Fette Nutzen suchend, der gewöhnlichen Desinfection mit Wasser, Seife und Sublimat, Einreiben der Hand mit Glycerin oder Lanolin nachhergehen; das eine wählte ich wegen seiner Löslichkeit in Wasser, das andere besonders wegen seiner durch Gottstein festgestellten absoluten Keimfreiheit, da es natürlich nicht erwünscht war, mit dem Fett etwa noch der Haut Mikroorganismen zuzuführen. Der gesuchte Nutzen hat sich nicht ergeben; zum mindesten ist er nicht auffallend. Vielleicht kann man den hierher gehörigen Versuchen aber doch einigen Werth beilegen, deshalb, weil sie gezeigt haben, dass das Einsalben wenigstens keinen Schaden bringt, dass es die Desinfection nicht erschwert. In diesem Bewusstsein wird Mancher die fragliche Manipulation nicht an der Hand weissen in Fällen, wo die Haut eventuell durch häufige Desinfectionen gereizt ist, wo alsdann das Einfetten den Reiz einer neuen Waschung sicherlich abstumpft; für gewöhnlich wird man sie aber als überflüssig bei Seite lassen.

So kann also nach meinen Beobachtungen die übliche einfache Waschung mit warmem Wasser, Seife und Sublimat (unter Benutzung der Bürste etc.) allen Ersatzmitteln die Spitze bieten; ein sehr trauriger Trost! ein negatives Facit, weil ich oben auch keine gleichmässige Erfolge absprechen musste, ein um so tristeres Resultat, weil die Veröffentlichungen Forster's, Kümmell's und Warbringer's zu ganz anderen Erwartungen berechtigten. Man

wird entgegnen, für die principielle Möglichkeit der Vernichtung der Keime an der Hand müsste auch ich Zeugniß ablegen; der Erfolg aber, wenn er nur einmal eingetreten, ohne dass er besonders günstigen Bedingungen zu verdanken war, immer wieder heraufzubeschwören, sei nur Sache der Uebung; diese hätte ich wohl von vornherein weniger besessen, als jene Autoren; die Misserfolge bezeichneten jedenfalls den Anfang meiner Versuche. Ausserdem wären meine Hände vielleicht besonders schwer zu bearbeiten. — Letzteres glaube ich nicht. Ersteres gebe ich ohne weiteres zu und erhebe den Vorwurf gegen die Vorarbeiter, nicht betont zu haben, dass die Sicherheit, welche sie ihren Methoden vindiciren, sich nur auf ihre eigene, bevorzugte, Person bezieht, nicht auf andere, welche die Durchschnittsmasse für sich beanspruchen. Nicht etwa eine überflüssige Erklärung, eine selbstverständliche Reserve! So augenfällig die Ungleichmässigkeit der Hände ist, so unterschiedlich die Technik, es könnte bedeutungslos sein gegenüber der Wirkungskraft der Mittel, mit welchen wir den Kampf gegen die Feinde der Asepsis an den Fingern aufnehmen. Wie wenig kommt die gleiche Widerstandsfähigkeit allen den Mikroorganismen zu, welche dieselbe Sublimatlösung vernichtet! Warum soll in unserem Falle nicht der gleiche Spielraum gewährt, warum die Macht jener Mittel nicht stark genug sein, um auch eine Vermehrung der Schwierigkeiten, welche sich an und für sich zu überwinden haben, zu vertragen, um selbst bei nicht ganz uneingeschränkter Entfaltung zu genügen! Dass es sich anders verhält, dass deshalb die detaillirten, auf die Minuten bestimmten Desinfectionsvorschriften irreleiten, dass allgemein gültige Vorschriften nur in grossen Zügen aufzustellen; dass eine Sterilisirung der Hand möglich, eine Sicherheit in dieser Beziehung aber nur individuell sei, das sind die Schlüsse, welche meine Versuche ergeben. — Das Mass mechanischer und chemischer Kräfte, welches zur Sterilisirung der Hand nöthig ist, wird, und dies zum Schluss nochmals zusammenzufassen, am besten erreicht durch gründliches Bürsten und Weichen, zuerst mit möglichst warmem Wasser und Seife, darauf — kürzere Zeit — mit 1procentiger wässriger Sublimatlösung; einfaches Eintauchen in Sublimat genügt nicht. (Dazu vergleiche man die zuletzt anhangsweise aufgeführten Versuche!) Eine Modification der vorbereitenden Re-

ung (Wasser, Seife) hat sich ebenso wenig probat gezeigt, wie Ersetzung des Sublimats durch andere Antiseptica. Die aufmerksamste Bearbeitung muss den Fingerspitzen mit den Unter-  
 gelräumen gewidmet werden; denn die Eigenthümlichkeit letz-  
 ter ist es, wie die Fürbringer'sche Untersuchungsmethode  
 kennen lässt, nicht aber die Derbheit der Haut an den Fingern,  
 die Widerstandsfähigkeit ihrer Epidermis, welche die ausreichende  
 Reinigung der Hand so ausnehmend erschwert, während es keiner  
 grossen Anstrengung, keines langen Zeitaufwandes bedarf, um die  
 Haut anderer Körpergebiete, wie die der Arme, den Anforderungen  
 der Antisepsis entsprechend herzurichten, in aller Vollkommenheit  
 desinficiren.

Herr Professor Dr. Neisser gab mir zu der vorliegenden  
 Arbeit die Anregung, unterstützte mich mannigfach bei Ausfüh-  
 rung derselben und stellte mir für meine Versuche die Mittel  
 der dermatologischen Klinik in umfangreichstem Masse zur Ver-  
 fügung. Ihm dafür aufrichtigen Dank auch an dieser Stelle aus-  
 sprechen, ist für mich eine ebenso angenehme, wie dringende  
 Pflicht.



## Lebenslauf.

---

Verfasser, geboren den 20. September 1864 zu Breslau, mährischer Confession, Sohn des Kaufmannes Julius Landsberg und seiner Ehefrau Bertha, geb. Jaffe, erhielt den ersten Schulunterricht auf der Vorschule des Gymnasiums zu St. Elisabeth in Breslau, welches er von Michaelis 1870 bis Ostern 1872 besuchte; alsdann trat er in die Vorschule des Gymnasiums zu St. Marien Magdalena in Breslau über; in letzteres Gymnasium selbst wurde er Michaelis 1873 aufgenommen; Ostern 1882 verliess er es mit dem Zeugniss der Reife. Die ersten fünf Semester studirte er in Breslau, woselbst er im Mai 1884 das Tentamen physicum bestand; Michaelis 1884 bezog er die Berliner Hochschule, kehrte jedoch Ostern 1885 wieder nach Breslau zurück; hier fungirte er während des Sommerhalbjahres 1885 als Unterassistent an der dermatologischen Klinik. Während des Wintersemesters 1886/87 absolvirte er vor der Prüfungscommission zu Breslau das medicinische Staatsexamen und beendete dasselbe am 9. März 1887. Am 28. März desselben Jahres bestand er gleichfalls in Breslau das Tentamen rigorosum. Vom 1. April 1887 bis 1. October 1887 und vom 1. November 1887 bis 1. Mai 1888 genügte er seiner Dienstpflicht mit der Waffe beziehungsweise als einjährig-freiwilliger Arzt beim 1. Schlesischen Grenadier-Regiment Nr. 10. Seit December 1887 bekleidet er die Stelle des Assistenzarztes an der Dr. Wolffberg'schen Augenklinik (vormals Dr. Jany) in Breslau.

Während seiner Studienzeit besuchte er die Vorlesungen, Kurse und Kliniken folgender Herren Professoren und Docenten:

In Breslau: Biermer, Born, Buchwald, F. Cohn, H. Cohn, Fischer, Förster, Fränkel, Freund, Fritsch, Gierke, Gottstein, Haeser, Hasse, Heidenhain, Hirt, Jacobi, Joseph, Köwig, Magnus, Meyer, Neisser, Poleck, Ponfick, Richter, Röhm, Rosenbach, Roux, Soltmann, Strasser, Unverricht, Wernicke.

In Berlin: v. Bergmann, du Bois-Reymond, v. Frerichs, Lewin, Martin, Virchow.

Allen diesen Herren, seinen hochverehrten Lehrern, sagt der Verfasser hiermit seinen herzlichsten Dank.



## Thesen.

---

1. Durch energisches Zusammenwirken mechanischer und chemischer Kräfte ist eine ausreichende Desinfection der Hand zu erlangen. Dieses nothwendige Zusammenwirken wird am besten erzielt durch Anwendung erst von Wasser und Seife, dann von Sublimat in der üblichen Concentration, unter umfassendem Gebrauch der Bürste. Eine detaillirte Desinfectionsvorschrift, mit Aufstellung von Zeitmassen zu geben, ist nicht angebracht, weil sie keine allgemeine Giltigkeit haben würde.

2. Simulation von Augenkrankheiten wird mit Hilfe der Wolffberg'schen Farbenmethode schneller und sicherer erkannt als durch sonstige Functionsprüfungen des Auges.

3. Veränderung der Athmung und der chemischen Processe in den Geweben laufen nicht immer parallel.





